



Proba de

Código

CSPEC02

Química

Química



1. Formato da proba

Formato

- A proba constará de nove cuestións e catro problemas, distribuídos así:
 - Problema 1: tres cuestións.
 - Problema 2: tres cuestións.
 - Problema 3: tres cuestións.
 - Problema 4: dúas cuestións.
 - Bloque de nove cuestións.
- As cuestións tipo test teñen tres posibles respostas das que soamente unha é correcta.

Puntuación

- Puntuación: 0'5 puntos por cuestión tipo test correctamente contestada.
- Cada cuestión tipo test incorrecta restará 0'125 puntos.
- As respostas en branco non descontarán puntuación.

Duración

- Este exercicio terá unha duración máxima de: 60 minutos.



2. Exercicio

Utilice esta táboa periódica para realizar o exercicio

1 I A	2 II A	3 III B	4 IV B	5 V B	6 VI B	7 VII B	8 VIII B	9 VIII B	10 VIII B	11 I B	12 II B	13 III A	14 IV A	15 V A	16 VI A	17 VII A	18 VIII A
1 H 1,00797	2 He 4,0026																
3 Li 6,939	4 Be 9,0122											5 B 10,811	6 C 12,0112	7 N 14,0067	8 O 15,9994	9 F 18,9984	10 Ne 20,183
11 Na 22,9898	12 Mg 24,312											13 Al 26,9815	14 Si 28,086	15 P 30,9738	16 S 32,064	17 Cl 35,453	18 Ar 39,948
19 K 39,102	20 Ca 40,08	21 Sc 44,956	22 Ti 47,90	23 V 50,942	24 Cr 51,996	25 Mn 54,938	26 Fe 55,847	27 Co 58,933	28 Ni 58,71	29 Cu 63,54	30 Zn 65,37	31 Ga 69,72	32 Ge 72,59	33 As 74,9216	34 Se 78,96	35 Br 79,909	36 Kr 83,80
37 Rb 85,47	38 Sr 87,62	39 Y 88,905	40 Zr 91,22	41 Nb 92,906	42 Mo 95,94	43 Tc (99)	44 Ru 101,07	45 Rh 102,905	46 Pd 106,4	47 Ag 107,870	48 Cd 112,40	49 In 114,82	50 Sn 118,69	51 Sb 121,65	52 Te 127,60	53 I 126,904	54 Xe 131,30
55 Cs 132,905	56 Ba 137,34	57 La 138,91	72 Hf 178,49	73 Ta 180,948	74 W 183,85	75 Re 186,2	76 Os 190,2	77 Ir 192,2	78 Pt 195,09	79 Au 196,967	80 Hg 200,59	81 Tl 204,37	82 Pb 207,19	83 Bi 208,98	84 Po (210)	85 At (210)	86 Rn (222)
87 Fr (223)	88 Ra (226)	89 Ac (227)	104 Rf (261)	105 Db (262)	106 Sg (266)	107 Bh (262)	108 Hs (265)	109 Mt (266)	110 Uun (269)	111 Uuu (272)	112 Uub (272)	113 Uut (285)	114 Uuq (285)	115 Uup (289)	116 Uuh (289)	117 Uus (293)	118 Uuo (293)

58 Ce 140,12	59 Pr 140,907	60 Nd 144,24	61 Pm (147)	62 Sm 150,35	63 Eu 151,96	64 Gd 157,25	65 Tb 158,924	66 Dy 162,50	67 Ho 164,930	68 Er 167,26	69 Tm 168,934	70 Yb 173,04	71 Lu 174,97
90 Th 232,038	91 Pa (231)	92 U 238,03	93 Np (237)	94 Pu (242)	95 Am (243)	96 Cm (247)	97 Bk (247)	98 Cf (249)	99 Es (254)	100 Fm (253)	101 Md (256)	102 No (256)	103 Lr (257)



Problema 1

A análise elemental dun hidrocarburo gasoso revela que contén un 82,7 % de carbono e un 17,3 % de hidróxeno. Tamén se determina que a súa masa molecular é 58,12 g/mol.

El análisis elemental de un hidrocarburo gaseoso revela que contiene un 82,7 % de carbono y un 17,3 % de hidrógeno. También se determina que su masa molecular es 58,12 g/mol.

1. Determine a súa fórmula molecular.

Determine su fórmula molecular.

- A** Metilciclopropano.
- B** Propano.
- C** Butano.

2. Calcule a densidade dese gas en condicións normais de presión e temperatura (dato: $R = 0,082 \text{ atm}\cdot\text{L}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$).

Calcule la densidad de ese gas en condiciones normales de presión y temperatura (dato: $R = 0,082 \text{ atm}\cdot\text{L}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$).

- A** 2,59 g/L
- B** 0,39 g/L
- C** 2,38 g/L

3. Determine a concentración dunha disolución que contén 5 g do antedito gas nun recipiente de 14 L de volume.


Determine la concentración de una disolución que contiene 5 g de dicho gas en un recipiente de 14 L de volumen.

- A** 0,83 M
- B** 0,048 M
- C** $6,1\cdot 10^{-3}$ M

**Problema 2**

Na reacción indicada deseguido, os valores de ΔH° e ΔS° son $-61,1 \text{ kJ}$ e $-132,1 \text{ J/K}$ respectivamente. Supondo que estes valores son independentes da temperatura, determine:

En la reacción indicada a continuación, los valores de ΔH° y ΔS° son $-61,1 \text{ kJ}$ y $-132,1 \text{ J/K}$ respectivamente. Suponiendo que estos valores son independientes de la temperatura, determine:

**4.** O valor de ΔG° nesas condicións.

El valor de ΔG° en esas condiciones.

- A** $-100,4 \text{ kJ}$
- B** $-21,7 \text{ kJ}$
- C** $39,3 \text{ kJ}$

5. A masa do óxido de diplata que se obterá a partir de 1 kg de prata se o rendemento da reacción é dun 75% .

La masa de óxido de diplata que se obtendrá a partir de 1 kg de plata si el rendimiento de la reacción es de un 75% .

- A** $805,6 \text{ g}$
- B** $1074,2 \text{ g}$
- C** $1611,2 \text{ g}$

6. A partir do dato de ΔH° calcule a variación de entalpía estándar da reacción de descomposición dun mol de óxido de diplata nos seus elementos en estado natural.

A partir del dato de ΔH° calcule la variación de entalpía estándar de la reacción de descomposición de un mol de óxido de diplata en sus elementos en estado natural.

- A** $61,1 \text{ kJ}$
- B** $30,6 \text{ kJ}$
- C** $-30,6 \text{ kJ}$



Problema 3

Disponse de 100 mL dunha disolución de ácido acético (monoprótico) 0,5 M, cuxa constante de acidez é $K_a = 1,8 \cdot 10^{-5}$.

Se dispone de 100 mL de una disolución de ácido acético (monoprótico) 0,5 M, cuya constante de acidez es $K_a = 1,8 \cdot 10^{-5}$.

7. Calcule o pH da disolución.

Calcule el pH de la disolución.

- A** 3,0
- B** 0,3
- C** 2,5

8. Determine o volume dunha disolución de hidróxido sódico 0,75 M que cumprirá para valorar a antedita disolución de ácido acético.

Determine el volumen de una disolución de hidróxido sódico 0,75 M que será necesario para valorar dicha disolución de ácido acético.

- A** 0,4 mL
- B** 150 mL
- C** 66,7 mL

9. Que pH terá a disolución resultante da valoración anterior?

¿Qué pH tendrá la disolución resultante de la valoración anterior?

- A** Básico.
- B** Neutro.
- C** Ácido.



Problema 4

Dados os potenciais estándar de redución do ión permanganato en medio ácido e do ferro, $E^\circ(\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}) = 1,51 \text{ V}$ e $E^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0,44 \text{ V}$.

Dados los potenciales estándar de reducción del ión permanganato en medio ácido y del hierro, $E^\circ(\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}) = 1,51 \text{ V}$ y $E^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0,44 \text{ V}$.

- 10.** Calcule o potencial estándar da pila que se podería construír empregando ambas as semirreaccións.

Calcule el potencial estándar de la pila que se podría construir empleando ambas semirreacciones.

- A** 1,07 V
- B** 1,95 V
- C** 0,82 V

- 11.** Indique cal das seguintes ecuacións representa o proceso global que ten lugar na pila:

Indique cuál de las siguientes ecuaciones representa el proceso global que tiene lugar en la pila:


- A** $2 \text{ MnCl}_2 + 5 \text{ FeCl}_2 + 2 \text{ KCl} + 8 \text{ H}_2\text{O} \rightarrow 2 \text{ KMnO}_4 + 5 \text{ Fe} + 16 \text{ HCl}$
- B** $2 \text{ KMnO}_4 + 5 \text{ Fe} + 16 \text{ HCl} \rightarrow 2 \text{ MnCl}_2 + 5 \text{ FeCl}_2 + 2 \text{ KCl} + 8 \text{ H}_2\text{O}$
- C** $5 \text{ FeCl}_2 + 2 \text{ KMnO}_4 + 10 \text{ H}_2 \rightarrow 5 \text{ Fe} + 2 \text{ MnCl}_2 + 2 \text{ KCl} + 4 \text{ HCl} + 8 \text{ H}_2\text{O}$



Cuestións

12. Indique cal das seguintes expresións de K_c para o equilibrio de descomposición do dicloruro de carbonilo é correcta.

Indique cuál de las siguientes expresiones de K_c para el equilibrio de descomposición del dicloruro de carbonilo es correcta.






A $K_c = \frac{1}{[\text{CO}][\text{Cl}_2]}$

B $K_c = \frac{[\text{CO}][\text{Cl}_2]}{[\text{COCl}_2]}$

C $K_c = [\text{CO}][\text{Cl}_2]$

13. Cal dos seguintes compostos está incorrectamente formulado?

¿Cuál de los siguientes compuestos está incorrectamente formulado?

 <p>Ácido etanoico</p>	 <p>2-butanol</p>	 <p>Propanoato de etilo</p>
A	B	C

14. Ordene os seguintes elementos en orde crecente de enerxía de ionización: Cl, K, I, Zn.

Ordene los siguientes elementos en orden creciente de energía de ionización: Cl, K, I, Zn.

A $\text{K} < \text{I} < \text{Zn} < \text{Cl}$

B $\text{K} < \text{Zn} < \text{I} < \text{Cl}$

C $\text{K} < \text{Zn} < \text{Cl} < \text{I}$



15. Que tipo de interacción se debilita no proceso de vaporización do amoníaco?

¿Qué tipo de interacción se debilita en el proceso de vaporización del amoníaco?

A As pontes de hidróxeno.

Los puentes de hidrógeno.

B As forzas de Van der Waals.


Las fuerzas de Van der Waals.

C Os enlaces covalentes.

Los enlaces covalentes.


16. Sinala cal das seguintes moléculas está incorrectamente representada segundo a Teoría de Lewis e a Teoría da Repulsión dos Pares de Electróns da Capa de Valencia:

Señale cuál de las siguientes moléculas está incorrectamente representada según la Teoría de Lewis y la Teoría de la Repulsión de los Pares de Electrones de la Capa de Valencia:



17. Dado o equilibrio ácido-base do amonio, indique como evolucionará ao engadirlle ións hidróxido.

Dado el equilibrio ácido-base del amonio, indique cómo evolucionará al añadirle iones hidróxido.



A Non se modifica porque o hidróxido non é ningunha das especies presentes no equilibrio.

No se modifica porque el hidróxido no es ninguna de las especies presentes en el equilibrio.

B Desprázase cara á esquerda porque consome ións hidronio.

Se desplaza hacia la izquierda porque consume iones hidronio.

C Desprázase cara á dereita para compensar os ións hidronio consumidos.

Se desplaza hacia la derecha para compensar los iones hidronio consumidos.



18. Unha das consecuencias da chuvia ácida é a acidificación dos lagos, que prexudica ás especies que habitan neles. Cal cre que sería o método máis axeitado para recuperar a vida neles?

Una de las consecuencias de la lluvia ácida es la acidificación de los lagos, que perjudica a las especies que habitan en ellos. ¿Cuál cree que sería el método más adecuado para recuperar la vida en ellos?

A Engadir hidróxido cálcico.

Añadir hidróxido cálcico.

B Engadir hidroxenocarbonato sódico (bicarbonato sódico).

Añadir hidroxenocarbonato sódico (bicarbonato sódico).

C Engadir nitrato sódico.

Añadir nitrato sódico.

19. Para o equilibrio de solubilidade do fosfato potásico (K_3PO_4), exprese K_s en función da solubilidade do sal, s .

Para el equilibrio de solubilidad del fosfato potásico (K_3PO_4), exprese K_s en función de la solubilidad de la sal, s .


A $K_s = 27 s^4$

B $K_s = s^4$

C $K_s = 3 s^2$

20. Os obxectos de prata ennegrecen por contacto co ar contaminado con sulfuro de dihidróxeno, formando sulfuro de diplata, negro, segundo se indica na reacción. Cal é o axente oxidante?

Los objetos de plata se ennegrecen por contacto con aire contaminado con sulfuro de dihidrógeno, formando sulfuro de diplata, negro, según se indica en la reacción. ¿Cuál es el agente oxidante?



A Ag

B O_2

C H_2S



3. Solución para as preguntas tipo test

Nº	A	B	C
1			X
2	X		
3			X
4		X	
5	X		
6		X	
7			X
8			X
9	X		
10		X	
11		X	
12			X
13	X		
14		X	
15	X		
16			X
17			X
18		X	
19	X		
20		X	

Nas preguntas de test, por cada resposta incorrecta descontaranse 0'125 puntos. As respostas en branco non descontarán puntuación.